

Corpus alienum oog verwijderen

Vorbereiding

Klaarleggen materialen:

- wattenstokje
- steriele oogfrees/guts of subcutane injectienaald (G25-27)
- anesthesische oogdruppels (minims)
- eye-pad of gaasjes
- scheurbaar hechtpleister
- oogzalf
- (voorhoofds)loep of oftalmoscoop

Toelichting

Anaesthesie

Druppel anaestheticum in het oog.

Inspectie

- Lokaliseer corpus alienum door de cornea in alle richtingen te laten kijken.
- Onderste ooglidplooï: naar boven laten kijken, trek onderooglid iets naar beneden.
- Bovenste ooglidplooï: Klap het bovenste ooglid om met behulp van een wattenstokje, naar beneden laten kijken.

Uitvoering

- Probeer eerst het corpus alienum met een bevochtigd wattenstokje te verwijderen.
- Probeer het corpus alienum los te wippen uit de cornea. Houd daarbij de naald of de oogfrees onder een vlakke hoek met de cornea.
- Gebruik oogboortje (als het corpus alienum nog vast zit of bij een roestring). Plaatst steriel oogboortje op boorkop. Oefen niet meer druk uit op oogbol dan waarbij enige vervorming ontstaat. Maakt met het boortje kleine, cirkelvormige bewegingen en verwijdert niet meer corneaepitheel dan nodig is.

Afvoeren van verontreinigde materialen

In de afvalbak: gebruikte gazen en spuit.

In naaldencontainer: gebruikte naalden

Corpus alienum oog verwijderen

Nazorg

Voorlichten

- Geef na verwijdering een oogzalf.
- Verbind, na opvullen met gaasje, met eyepad of gaas en 3 pleisters.
- Inspecteer na 24 uur op mogelijke roesting na verwijderen van metaal.

Literatuur

- Rietveld RP, Cleveringa JP, Blom GH, Baggen MEJM, Bink D, Oltheten JMT, Van der Weele GM. NHG-Standaard Het rode oog (Eerste herziening). Huisarts Wet 2006;49(2):78-91.
- Goudswaard AN, In 't Veld CJ, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. 2e druk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2014:112-7