

Wondsluiten met lijm

Vorbereiding

Klaarleggen instrumentarium:

- flacon wondlijm of Minims met wondlijm
- handschoenen
- gazen
- hechtstrips

Toelichting

Wondinspectie

- Kleine, oppervlakkige en rechte wond zonder veel spanning op de randen.
- Wondranden liggen goed aan of kunnen goed naar elkaar toe worden gebracht.

Desinfecteren van de wondranden

- Trek handschoenen aan.
- Maak de wondranden schoon en droog.

Lijmen

- Breng de wondranden naar elkaar toe door druk van duim en wijsvinger of breng de wond met duim en wijsvinger in de lengte op spanning zodat de wondranden aanliggen.
- Waarschuw dat de lijm een kortdurende prikkende sensatie kan geven.
- Breng een dun laagje lijm op de huid van de wondranden aan.
- Absorbeer direct eventueel overtollige lijm met de punt van een gaasje.
- Houd de wondranden bijeen tot lijm droog is, maar raakt de lijm niet aan.
- Breng ter ondersteuning een of meerdere hechtstrips aan.

Afvoeren van verontreinigde materialen

In de afvalbak: gebruikte gazen en handschoenen

Wondsluiten met lijm

Nazorg

Voorlichten

- Leg uit dat de hechtstrips liefst 5-10 dagen moeten blijven zitten, totdat het litteken voldoende sterk is.
- Leg de patiënt uit dat bij de volgende tekenen van ontsteking gewaarschuwd moet worden: pijn, warmte, roodheid, uitscheiding van vocht, pus of bloed.
- Controle van de wond is meestal niet nodig.

Literatuur

Goudswaard AN, In 't Veld CJ, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2014.