

Fluisterspraaktest

Vorbereiding

Klaarleggen materialen:

- Otoscoop
- Kaartje met 12 combinaties van 3 cijfers en letters

Toelichting

Vorbereiding

- Verricht alleen bij personen >6 jaar
- Zorg voor een stille omgeving
- Verricht otoscopie voorafgaande aan de fluisterspraaktest (zie Toelichting Otoscopie)
- Ga achter de patiënt zitten of staan op gelijke hoogte met de patiënt: mond onderzoeker op de hoogte van oor patiënt

Toelichting

- Laat de patiënt één oor afsluiten met stevige druk op de trachus of met vinger in gehoorgang
- Vraag de patiënt te herhalen wat hij hoort
- Fluister de combinaties na volledige uitademing met de reservelucht zonder de stembanden te gebruiken
- Doe dit met de mond op armlengte afstand van de patiënt
- Fluister per oor zes combinaties van 3 cijfers en letters; noem de combinatie niet voor een tweede keer:
 - ene oor: 3F6, G7L, O7S, 2K4, 8S5, U8X;
 - andere oor: F5C, Z3L, 6K7, 3S8, 2R9, X4U.
- Herhaal de procedure met het andere oor

Nazorg

Voorlichten

- De test is afwijkend als de patiënt meer dan 4 (van de 6) combinaties niet goed herhaalt
- Bij een afwijkende test is het gehoorverlies meer dan 30 dB.
- Bij plotselinge uitval van gehoor aan één kant moet de patiënt met spoed verwezen worden
- Bij een afwijkende test laat audiometrie verrichten

Fluisterspraaktest

Literatuur

- De Jongh TOH, e.a. Fysische diagnostiek. Bohn, Stafleu van Loghum, Houten 2015.
- NHG-Standaard Slechthorendheid. (zie bijlage). Huisarts Wet 2014;57(6):302-12.